



Laboratoire départemental

60 AV. Marcel UNAL - 82 000 MONTAUBAN
05 63 66 71 71

ELEVEUR	VETERINAIRE
N° cheptel EDE :	Vétérinaire sanitaire :
Atelier : ☐ Laitier ☐ Allaitant	N° ordre vétérinaire à mandater :
Nom, prénom ou raison sociale, adresse :	Nombre de kms parcourus A/R : km
	Date de prélèvement :
Destinataire des résultats : ☐ Oui ☐ Non	Destinataire des résultats : ☐ Oui ☐ Non
PRESCRIPTEUR	Signature :
Reconnais avoir pris connaissance des tarifs, des méthodes, des délais, des conditions générales de vente et autorise le laboratoire à sous-traiter les prestations qu'il ne peut réaliser et à choisir la méthode d'analyse la plus appropriée.	

DIAGNOSTIC AVORTEMENT N°1	Code pays (numéro à 10 chiffres) □□ □□□□□□□□	Stade ☐ 1er tiers de ☐ 2ème tiers gestation ☐ 3ème tiers	Délai entre ☐ < 7j ☐ inconnu avortement ☐ 7 à 15j et visite ☐ > 15j	Date avortement
	KIT ANALYSES Matrices nécessaires : <u>sang de la mère</u> : tube sec + tube EDTA & <u>matrices fœtales</u> : rate + cerveau + liquide stomacal de l'avorton			
	☒ BRUCELLOSE (Obligatoire) ☐ KIT 1 : BVD sérologie + Néosporose sérologie + Fièvre Q-pcr + FCO-pcr ☐ KIT 2 : Schmallenberg sérologie + Chlamydie sérologie + Anapl. phago. (Ehrlichiose)-pcr + Campylobacter en culture → Si la brucellose et les recherches du kit choisi sont négatives, l'autre kit est réalisé sans accord du client/vétérinaire : ☐ Oui ☐ Non			
	ANALYSES INDIVIDUELLES Matrices nécessaires HORS KIT → cf. verso			
	PCR : ☐ Fièvre Q ☐ Chlamydie ☐ FCO ☐ Schmallenberg ☐ Néosporose ☐ BVD ☐ Leptospirose ☐ Anapl. phago. (Ehrlichiose) Séro. : ☐ Fièvre Q ☐ Chlamydie ☐ FCO ☐ Schmallenberg ☐ Autre : Bactério. : ☐ Bacterio (aérobie) sur milieux usuels ☐ Stamp ☐ Salmonella ☐ Listeria mono. ☐ Campylobacter ☐ Moisissures			
Laboratoire	Matrices reçues : ☐ Tube sec ☐ Tube EDTA ☐ Rate ☐ Cerveau ☐ Liquide stomacal ☐ Ecouvillon endocervical ☐ Placenta			

DIAGNOSTIC AVORTEMENT N°2	Code pays (numéro à 10 chiffres) □□ □□□□□□□□	Stade ☐ 1er tiers de ☐ 2ème tiers gestation ☐ 3ème tiers	Délai entre ☐ < 7j ☐ inconnu avortement ☐ 7 à 15j et visite ☐ > 15j	Date avortement
	KIT ANALYSES Matrices nécessaires : <u>sang de la mère</u> : tube sec + tube EDTA & <u>matrices fœtales</u> : rate + cerveau + liquide stomacal de l'avorton			
	☒ BRUCELLOSE (Obligatoire) ☐ KIT 1 : BVD sérologie + Néosporose sérologie + Fièvre Q-pcr + FCO-pcr ☐ KIT 2 : Schmallenberg sérologie + Chlamydie sérologie + Anapl. phago. (Ehrlichiose)-pcr + Campylobacter en culture → Si la brucellose et les recherches du kit choisi sont négatives, l'autre kit est réalisé sans accord du client/vétérinaire : ☐ Oui ☐ Non			
	ANALYSES INDIVIDUELLES Matrices nécessaires HORS KIT → cf. verso			
	PCR : ☐ Fièvre Q ☐ Chlamydie ☐ FCO ☐ Schmallenberg ☐ Néosporose ☐ BVD ☐ Leptospirose ☐ Anapl. phago. (Ehrlichiose) Séro. : ☐ Fièvre Q ☐ Chlamydie ☐ FCO ☐ Schmallenberg ☐ Autre : Bactério. : ☐ Bacterio (aérobie) sur milieux usuels ☐ Stamp ☐ Salmonella ☐ Listeria mono. ☐ Campylobacter ☐ Moisissures			
Laboratoire	Matrices reçues : ☐ Tube sec ☐ Tube EDTA ☐ Rate ☐ Cerveau ☐ Liquide stomacal ☐ Ecouvillon endocervical ☐ Placenta			

DIAGNOSTIC AVORTEMENT N°3	Code pays (numéro à 10 chiffres) □□ □□□□□□□□	Stade ☐ 1er tiers de ☐ 2ème tiers gestation ☐ 3ème tiers	Délai entre ☐ < 7j ☐ inconnu avortement ☐ 7 à 15j et visite ☐ > 15j	Date avortement
	KIT ANALYSES Matrices nécessaires : <u>sang de la mère</u> : tube sec + tube EDTA & <u>matrices fœtales</u> : rate + cerveau + liquide stomacal de l'avorton			
	☒ BRUCELLOSE (Obligatoire) ☐ KIT 1 : BVD sérologie + Néosporose sérologie + Fièvre Q-pcr + FCO-pcr ☐ KIT 2 : Schmallenberg sérologie + Chlamydie sérologie + Anapl. phago. (Ehrlichiose)-pcr + Campylobacter en culture → Si la brucellose et les recherches du kit choisi sont négatives, l'autre kit est réalisé sans accord du client/vétérinaire : ☐ Oui ☐ Non			
	ANALYSES INDIVIDUELLES Matrices nécessaires HORS KIT → cf. verso			
	PCR : ☐ Fièvre Q ☐ Chlamydie ☐ FCO ☐ Schmallenberg ☐ Néosporose ☐ BVD ☐ Leptospirose ☐ Anapl. phago. (Ehrlichiose) Séro. : ☐ Fièvre Q ☐ Chlamydie ☐ FCO ☐ Schmallenberg ☐ Autre : Bactério. : ☐ Bacterio (aérobie) sur milieux usuels ☐ Stamp ☐ Salmonella ☐ Listeria mono. ☐ Campylobacter ☐ Moisissures			
Laboratoire	Matrices reçues : ☐ Tube sec ☐ Tube EDTA ☐ Rate ☐ Cerveau ☐ Liquide stomacal ☐ Ecouvillon endocervical ☐ Placenta			

Labo	Acheminement des échantillons par :	Visa :	N° dossier : D
	Date et heure de réception :		
	Etat des échantillons à la réception : ☐ réfrigérés ☐ Congelés ☐ T°C ambiante		

Laboratoire départemental

60 AV. Marcel UNAL - 82 000 MONTAUBAN
05 63 66 71 71



ANA. PHAGO. EHRlich.	Séro IF (+ j 21)	PCR	PCR					
ANA. MARGINAL E		PCR						
LEPTO	Séro aggl lyse (+ j 21)		PCR	PCR	PCR			PCR
BACTERIO GENERALE								
CAMPYLO BACTERIO			+	+				
LISTERIA BACTERIO			+	+			+	
SALM BACTERIO			+	+				
SBT	Séro ELISA						PCR	
FCO	Séro ELISA	PCR				PCR		
CHLAM	Séro ELISA		PCR ± stamp	PCR		PCR		
FQ	Séro ELISA		PCR ± stamp	PCR	PCR	PCR		
NEO	Séro ELISA						PCR	
BVD	Séro ELISA PCR					PCR		
BRU	Séro EAT		Bactério si séro +					
MERE	Tube sec 8j 2-8°C après coagulation	Tube EDTA 4j 2-8°C	Ecouvillon endocervical <8j après avortement 2-8°C	Liquide stomacal (i)	Foie (4-5 cm)	Rate (4-5 cm)	Cerveau (i)	Rein
	AVORTON							

Avorton entier si possible sinon prélever les organes cibles sous 48h, et les conserver entre 2 et 8°C
(i) Pour le cerveau ou le liquide stomacal, prélever 5ml à la seringue dans un vacutainer